

**捕獲された動物は体重の増減があることに注意！
大人のロリスの分類：**

※以前は*N.menagensis*がボルネオスローロリスと呼ばれていたが、今は*N.borneanus*がボルネオスローロリスと呼ばれ、*N.menagensis*はフィリピンスローロリスと呼ばれる。ほかの3種含めて、和名はついていないので、仮のもの。



ベンガルスローロリス
Nycticebus bengalensis

ジャワスローロリス
Nycticebus javanicus

スダスローロリス
Nycticebus coucang

*カヤンスローロリス
Nycticebus kayan

*ボルネオスローロリス
Nycticebus borneanus

*ヒルズスローロリス
Nycticebus hilleri

ピグミスローロリス
Nycticebus pygmaeus

*フィリピンスローロリス
Nycticebus menagensis


*成獣の写真ではない

生態学、教育、エンパワーメントを通じてスローロリスを守る


スローロリスの種の識別ガイド

識別に関する専門用語


頭部の分岐線とアイパッチ(目の周りの班)の形



背中筋



カラーチャート




ロリスの赤ちゃんまたは子どもかどうか？

YES

若いロリスは習慣で似通っていて、特に体重では識別が難しい。若い個体の識別には毛皮の特徴を使ってみよう。

生まれたて


16-60 g



目は開いていて、体はほとんど模様のない薄い色。ふわふわでやわらかい毛におおわれ、体に比べて頭が大きい。


生後3か月

250-400 g



四肢はふわふわのやわらかい毛におおわれる。成獣と違ってアイパッチは見分けにくい。かなり明るい色かとても黒い色になる。

体は白い毛で霜降り模様




生後6か月

330 g- 650 g



ふわふわの毛が粗くなり、色は濃くなる。顔の模様もわかりやすくなる。

*ふわふわでやわらかい体毛は10か月程度でなくなる。



取引されている個体は色がつけられているかもしれないことを考慮したうえで、顔の特徴を見てください。



Little Fireface Project

リトル・ファイアフェイス・プロジェクト

オックスフォードブルックス大学
夜行性霊長類研究グループ
Oxford, OX 3 0BP
United Kingdom

littlefireface@gmail.com
www.nocturama.org

Facebook Little Fireface Project
@queenfireface, @littlefireface
スローロリスファンへの寄付:

<http://www.brookes.ac.uk/about/news/slowloris/donate>